

## FINDIKTA MAYIS BÖCEĞİ

(*Melolontha melolontha*)

Yaprak ve çiçek üzerinde erginler beslenerek zarar yapar. Larvalar ağaç ve fidanların kökleriyle beslenirler. Fındıkların 1 cm. çapına kadar olan köklerini kolayca koparıp saçak kökleri tahrip eder. Bunun sonucu fındık ocaklarında uç kurumaları başlar kurumalar ana dallara kadar ilerler.

Erginler genellikle kızıl kahverengi görünüştedirler. Elytra'nın üzerinde birbirine paralel uzayıp sonunda birleşen çizgi çıkıntılar vardır. Elytra abdomeni tamamen örtmez son üç karın halkası açıkta kalır. Antenleri yelpaze şeklindedir.



Larvalar karakteristik olarak karın etrafında kıvrık; tombul ve beyazdır. Üç çift bacağı vardır. Vücudun son halkası çok büyük ve şişkin bir hal almıştır. Kadı lokması veya manas adlarıyla tanınır. Yumurtaları oval krem renktedir.





### Mücadelesi

**Kültürel Önlemler:** Ergin ve larvalar görüldükleri zaman toplanıp öldürülmelidirler.

**Kimyasal Mücadele:** 1 m<sup>2</sup> de 3 veya daha fazla larva varsa ilaçlama

yapılmalıdır. Eylül ve Ekim aylarında ilaçlama yapılabilir.

### Kullanılacak İlaçlar ve Dozları

Etkili Madde	Form.	Dozu
		(100 lt suya)
Endosülfan 360 g/l.	E.C.	8 ml.
Chlorpyrifos ethyl %25 W.P.		15 g

<b>Adres</b>	: Samsun Tarım İl Müdürlüğü 55060 Samsun
<b>Santral</b>	: 0 362 231 37 00
<b>Fax</b>	: 0 362 233 21 63
<b>e-mail</b>	: koruma@samsuntarim.gov.tr
<b>web</b>	: www.samsuntarim.gov.tr

## T.C. SAMSUN VALİLİĞİ

Tarım İl Müdürlüğü



### Fındıkta Mayıs Böceği

Fatma TAN  
Ziraat Mühendisi



No: B/11

2005