

POLYBRA YETİŞTİRİCİLİĞİ

POLYBRA çok iyi sindirilebilen yüksek verimli bir tetraploid hayvan yem şalgamı çeşididir. Yaprakları ve kökü koyun, düve, sığır ve süt inekleri tarafından büyük bir iştahla yenebilmektedir.

EKİM ZAMANI

Ege ve Akdeniz Bölgelerinde Ağustos/Eylül aylarında, Marmara, Orta Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadenizde Ağustos ayında ekimi yapılmaktadır.

Tohum Miktarı : Tohum yatağının yapısına göre 300-350 g/da, m²'ye 25-40 arası tohum yoğunluğu yeterlidir.

Ekim Derinliği : 1,5-2 cm

Sıra Aralığı : 20-35 cm sıra aralıklı veya serpme ekim yapılabilir. Tohumun atılmasından sonra tohumu örtmek üzere arazi tırmıklanır.



GÜBRELEME

Ekimden önce; 7 -10 kg (saf) N/dekar (Erken ekim için 10 kg, geç ekim için 7 kg); **10 kg (saf) P2O5/dekar** 5-10 kg (saf) **K2O/dekar** verilmelidir. Çıkiştan sonra hiç azot (N) uygulanmamalıdır.

YABANCI OT KONTROLÜ

Bitki boyu yüksekliği 3-7 cm iken, eğer serpme yapıldıysa araziyi tırmıklamak suretiyle, sıra aralıklı ekim yapıldıysa araziyi çapalamak suretiyle yabancı ot kontrolü yapılır.

SULAMA

Genellikle tohumlar ekimden 5 gün sonra çıkarlar. Çimlenme, çıkış ve fide aşamalarında toprağın üst tabakasının nem oranının korunması için, ekimi takip eden 2-3 hafta içinde az miktarlarda ancak sık sulama yapmak gereklidir. Bitkinin gelişmesinden sonra ise sulama, buharlaşma oranına bağlı olarak yapılmalıdır. Her sulama için uygulanması gereken en uygun su miktarı 30 mm dir (30.000 lt/da).



BESLEME

Hayvanlara köklerle birlikte yaprakları da yedirilmektedir. Yem şalgamları taze olarak yedirilmelidir. Böylece çiftçi her gün mahsulün bir kısmını hasat edecektir. Yumrular topraktan arındırılmalıdır. Süt sağımından sonra yedirilen POLYBRA, günde 40 kg'dan fazla yedirilmemelidir. Genelde, hayvanların kuru madde alımının %50'sini geçmemelidir.

VERİM

Dekara verimi 7,5-10 ton arasındadır. Bunun %45'i kök, %55'i yapraklardan oluşmaktadır. Köklerdeki kuru madde oranı %8,5 yapraklardaki ise %9,5'tir. Her 1 kg kuru madde için sindirilebilir ham protein miktarı 150 gramdır. Kuru maddedeki protein oranı yumrular için %11, yapraklar için %18'dir.

VERİMLİ

HAYVANCILIK İÇİN

HAYVANLARINIZIN

KABA YEM

GEREKSİNİMİNİ

KORUNGA İLE

GİDERİNİZ.

*Süt Verimi İçin Polybra
Yetiştiriniz*

Adres	: Samsun Tarım İl Müdürlüğü 55060 Samsun
Santral	: 0 362 231 37 00
Fax	: 0 362 233 21 63
e-mail	: cey@samsuntarim.gov.tr
web	: www.samsuntarim.gov.tr

T.C.
SAMSUN VALİLİĞİ
İl Tarım Müdürlüğü



Polybra Yetiştiriciliği

Binnaz TIKNAZOĞLU
Ziraat Mühendisi



No: T/20

2005